


חיסונים



מלי רובינשטיין

אחות מרפאה המטואונקולוגית

למה חיסונים?

- מערכת חיסונית ירודה.
- חשיפה לזיהומים בעיקר במערכת הנשימה.
- הסיכון לזיהום עולה עם שלב המחלה והטיפול הפעיל.

מידע כללי על חיסונים

- בזמן טיפול או במחלה פעילה אסור לקבל חיסונים חיים מוחלשים.
- לחולים ברמיסיה (החלמה מלאה) מעל 3 חודשים מסיום הטיפול מותר כל חיסון.
**מבטרה ואימונוגלובולינים מעל 6-8 חודשים מסיום טיפול.*

שפעת

חיסון שפעת - יש להתחסן מדי שנה (גם תוך כדי טיפולים).
(אלא אם מקבלים מבטרה או אימונוגלובולינים).



דלקת ריאות

חיסון נגד דלקת ריאות מורכב משני סוגים:

- **פרבנר- 13** זנים, חיסון מצומד.
- **פנאומוקס- 23** זנים, חיסון פוליסכרידי.

דרך מומלצת למתן החיסון:

1. מנה של פרבנר.
2. כעבור 8 שבועות מנה של פנאומוקס.
3. כעבור 5 שנים מנה נוספת של פנאומוקס

חיסונים בבני משפחה

- מותר ומומלץ שבני המשפחה יקבלו את כל חיסוני השגרה.
- חיסוני מטיילים מותרים לכולם.
- מומלץ שבני המשפחה יקבלו חיסון שפעת מדי שנה.
- מותר לבני המשפחה לקבל את חיסון שפעת חי מוחלש.

חיסונים בבני משפחה - המשך

- **חיסון פוליו דרך הפה (OPV) - לא מומלץ**
לילדים שגרים עם חולה מדוכא חיסון.
אם ילד \ נכד חוסן מומלץ להימנע ממגע עם הפרשות (צואה, שתן, רוק) למשך 6 שבועות.
- **חיסון רוטה וירוס - להימנע מהחלפת**
חיתולים במשך 4 שבועות.
- **אבעבועות רוח - במידה והילד פיתח פריחה**
אחרי החיסון יש להימנע ממגע עד שהנגעים חולפים.

שאלות?



תודה על ההקשבה

